


# Cáncer de Cuello Uterino: Lo Que Necesita Saber



El cáncer de cuello uterino es un cáncer que es prevenible y curable si es detectado en etapas tempranas.

EDAD	RECOMENDACION
20 años o menor	No es necesaria la prueba
21 a 29 años	Papanicolaou cada 3 años, sin prueba de VPH
30 a 65 años - Hable con su doctor para ver qué plan es mejor para usted	Papanicolaou solamente – cada 3 años
	VPH solamente – cada 5 años
	Papanicolaou y VPH – cada 5 años
65 y mas	No es necesaria la prueba

## Detección del Cáncer de Cuello Uterino

Papanicolau (o **Pap**) y/u Virus del Papiloma Humano (**VPH**)



## Síntomas Pueden Aparecer Como

\*no todos experimentan síntomas



Constante dolor pélvico



Sangrado vaginal anormal



Constante dolor de espalda



Descarga vaginal anormal

**¡Detección temprana salva vidas! ¡Hágase la prueba HOY!**

Adaptado de la División de Prevención y Control del Cáncer 2023 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

UC DAVIS HEALTH | COMPREHENSIVE CANCER CENTER  
Office of Community Outreach and Engagement

Generosamente apoyado por una subvención de la Fundación Bristol Myers Squibb